

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NISKU
W SPRAWIE OBOWIĄZKU POWIADAMIANIA
O PADŁYCH DZIKICH PTAKACH !!!

W związku z występowaniem na terytorium Polski licznych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku informuje o obowiązku powiadamiania o znalezieniu padłych dzikich ptaków.

Zimujące w Polsce dzikie ptactwo, głównie przedstawiciele blaszkodziobych - gatunki związane ze środowiskiem wodnym takie jak kaczki, gęsi i łabędzie, stanowi rezerwuuar wirusa grypy ptaków i może przyczynić się do zakażenia drobiu utrzymywanego w gospodarstwach oraz rozprzestrzeniania choroby na znaczne odległości.

Inne grupy ryzyka mogące mieć znaczenie w przenoszeniu wirusa to ptaki należące do rzędu siewkowatych, na przykład mewy, rybitwy, bekasy, czajki oraz ptaki drapieżne i krukowate.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku apeluje o niezwłoczne zgłaszanie przypadków znalezienia padłych ptaków należących do wymienionych grup ryzyka do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nisku pod nr telefonu 15 841 21 28.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce
hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność
i stosować odpowiednie środki bioasekuracji
minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków
do gospodarstwa, w szczególności:


1. Przetrzymanywać drób na ogrodzonej przestrzeni,
pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych
lub pod szczelnym przykryciem,
uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych,
do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne
oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami
umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

Hodowco!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta)
podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu


Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody;
objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu;
duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




1
Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




2
Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




3
Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i reguluj je nasączając aktywnym środkiem odkażającym.




4
Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



5
Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmnienić ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




6
Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.



7
Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.



8
Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.



9
Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



10
Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



11
Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.




12
Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skrzęty szyi, drgawki, biegunka, duszność) Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!


UWAGA ! HPAI


ZASADY, KTORYCH NALEŻY PRZESTRZEGAC W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)





 Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

 Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.


 Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.

 Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.

 Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.

 Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

 Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRYZAGRODOWY

ORAZ DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów dzikim ptactwem;
- odizolowanie kaczek i gęsi od innego drobiu;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (zwłaszcza ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego znacznego spadku nieśności, a zwłaszcza nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osoby zatrudnione w towarowych fermach drobiu nie powinny utrzymywać drobiu;
- zabezpieczenie słomy wykorzystywanej w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (w zamkniętych pomieszczeniach lub co najmniej w miejscach zadaszonych);
- eliminowanie wszelkich możliwych nieszczelności w kurnikach, stosowanie siatki w oknach i innych otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych.